



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SAÚDE
EDITAL Nº. 001 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015

RESULTADO DOS RECURSOS

QUESTÃO: Nº. 03 DA PROVA DE FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, MÉDICO VETERINÁRIO E ENFERMEIRO.

Resultado: Deferido

Justificativa: Questão anulada por duplicidade na resposta.

QUESTÃO: Nº. 04 DA PROVA DE FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, MÉDICO VETERINÁRIO E ENFERMEIRO.

Resultado: Deferido

Justificativa: Questão anulada por duplicidade na resposta.

QUESTÃO: Nº. 06 DA PROVA DE FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, MÉDICO VETERINÁRIO E ENFERMEIRO.

Resultado: Indeferido.

Justificativa: Pelas características o texto é classificado como artigo de opinião.

QUESTÃO: Nº. 15 DA PROVA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Resultado: Indeferido.

Justificativa: A referência adotada e recomendada no Edital do Processo Seletivo foi o Manual de Procedimentos em Vacinação do Ministério da Saúde de 2014, página 126, item 3.17.9.1, a via de administração é intramuscular em crianças menores de 2 anos no músculo vasto lateral da coxa.

QUESTÃO: Nº. 18 DA PROVA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Resultado: Indeferido.

Justificativa: A referência adotada e recomendada no Edital do Processo Seletivo foi o Guia para uso de Hemocomponentes do Ministério da Saúde de 2010. A referida questão não abordou a indicação médica, mas sim o procedimento e cuidados na transfusão de sangue e componentes. Na página 28, 73 e 110 abordam esses cuidados. Lembrando ainda que este Guia deixa claro que não existe transfusão de hemocomponentes sem a prescrição médica, portanto em toda transfusão o médico tem o conhecimento da mesma.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SAÚDE
EDITAL Nº. 001 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015

QUESTÃO: Nº. 13 DA PROVA DE ENFERMEIRO

Resultado: Indeferido.

Justificativa: A questão abordou os fatores de risco associado ao câncer do colo do útero e não ao câncer do útero. Pesquisando o site: www.hcancerbarretos.com.br, referente aos fatores de risco para o câncer de colo do útero verá que a obesidade não é considerada fator de risco para este tipo de câncer. Lembrando ainda que a referência recomendada no Edital do Processo Seletivo foi Controle dos Cânceres do Colo do útero e da mama do Ministério da Saúde de 2006. Constando na página 55, item 8.3, os fatores de risco associados ao câncer do colo do útero. A obesidade não é considerada fator de risco.

QUESTÃO: Nº. 22 DA PROVA DE ENFERMEIRO

Resultado: Indeferido.

Justificativa: O enunciado da questão aborda as medidas de precaução durante os cuidados prestados aos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) durante a internação, ou seja, quem presta estes cuidados durante a internação são os profissionais de Saúde. A referência recomendado no Edital do Processo Seletivo foi o Protocolo Estadual de Vigilância e Assistência aos Casos de Influenza A, Belo Horizonte - MG, 2009, na página 23, item 4.6, onde aborda as medidas de precaução para os profissionais de saúde, vindo de encontro ao enunciado da questão.

QUESTÃO: Nº. 12 DA PROVA DE FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO

Resultado: Indeferido.

Justificativa: Não foi solicitado na questão sobre a avaliação clínica de uma suspeita bacteriana, de tal forma que não teria necessidade de realização de outras provas bioquímicas, sorológicas e/ou enzimáticas para diferenciar estreptococos de estafilococos. Diante do que foi solicitado o grupo de bactérias era conhecido (estreptococos) e a sua principal características consiste no fato de serem classificados de forma ampla de acordo com a reação hemolítica em ágar sangue, ou seja, a sua ação sobre as hemácias. As referências bibliográficas citadas pelo candidato não condiz com as referencias do Edital do Processo Seletivo.

- Mcpherson, richard A. e Matthew R. Pincus. Diagnósticos Clínicos e Tratamentos por Métodos laboratoriais 21, ed. Barueri, SP: Manole, 2012. Pagina 1161.

QUESTÃO: Nº. 14 DA PROVA DE FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO

Resultado: Indeferido.

Justificativa: Hemostasia Primária refere-se a reatividade plaquetária no local da lesão muscular. Independente se o distúrbio é congênito ou adquirido a contagem de plaquetas, o prolongamento do tempo de sangramento e os testes que avaliam as respostas de agregação e secreção plaquetário in vitro são os testes ideais para avaliar a hemostasia primária. A dosagem de fibrinogênio e/ou os produtos da degradação do mesmo são usados frequentemente no diagnostico de CID (Coagulação intravascular disseminada). A dosagem de fibrinogênio possui



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SAÚDE
EDITAL Nº. 001 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015

sentido clínico laboratorial maior quando solicitado juntamente com o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. As referências bibliográficas citadas pela candidata não condiz com as referências do Edital do Processo Seletivo.

- Wallch, Jacques, M. D. Interpretação de Exames Laboratoriais, 7ª Ed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan S.A. 2003. Página 488.

- Mcpherson, richard A. e Matthew R. Pincus. Diagnósticos Clínicos e Tratamentos por Métodos laboratoriais 21, ed. Barueri, SP: Manole, 2012. Pagina 181.